



# ***ELECTROLIT***

Solução de reidratação oral líquida

Para o tratamento dietético de reidratação  
Alimento dietético destinado a fins medicinais específicos

**C.N.P. 7071969**



**PESO LIQUIDO:**

Caixa de 750ml com 3 unidades de 250 ml

**INGREDIENTES:**

Água desmineralizada; dextrose; maltodextrinas (milho); acidificante: ácido cítrico; cloreto de sódio; citrato de potássio; citrato de sódio; aroma de laranja; conservantes: sorbato de potássio; fructo-oligossacáridos (FOS), xilo-oligossacáridos (XOS); edulcorantes: sucralose, citrato de zinco.



## COMPOSIÇÃO

<b>ANÁLISE MÉDIA</b>	<b>Por 100 ml</b>	<b>Por 250 ml</b>	<b>mmol/l</b>
<b>Valor energético (kJ)</b>	43	108	
<b>Valor energético (kcal)</b>	10	25	
<b>Lípidos (g)</b> dos quais:	0	0	
<b>Ác. gordos Saturados (g)</b>	0	0	
<b>Hidratos de carbono (g)</b> dos quais:	2,5	6,3	
Açúcares (g)	1,5	3,8	
<b>Fibra alimentar (g)</b>	0,07	0,18	
Fructo-oligossacáridos (mg)	35	88	
Xilo-oligossacáridos (mg)	35	88	
<b>Proteínas (g)</b>	0	0	
<b>Sal (g)*</b>	0,29	0,7	
<b>Sódio (mg)</b>	114	285	50
<b>Potássio (mg)</b>	83	208	21
<b>Cloro (mg)</b>	130	325	37
<b>Zinco (mg)</b>	4,0	10	0,6
<b>Citrato (mg)</b>	360	900	19
<b>Osmolaridade (mOsm/l)</b>			210

\*Conteúdo de sal devido exclusivamente à presença de sódio

### INDICAÇÕES:

Solução especificamente formulada para a reidratação oral em caso de diarreia e/ou vômitos

### INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO, USO E ARMAZENAGEM:

Agitar antes de usar. Este produto está pronto a beber diretamente da embalagem, assim que retirar a tampa. Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de 24 horas. 50 ml de produto por kg de peso nas primeiras 4/6 horas. Conservar em lugar fresco e seco, afastado de fontes de calor. A data de “consumir de preferência até ao fim de” refere-se ao produto corretamente conservado e sem ser aberto.

### ALERGÉNIOS:

Livre de alergénios mencionados no Anexo II do Regulamento Europeu 1169/2011. Sem glúten

### PRECAUCIONES

- Este produto deve ser utilizado de acordo com as necessidades ou as recomendações de um profissional de saúde
- Produto para crianças maiores de 3 anos
- Não deve ser administrado como fonte alimentar única.



- Não adequado para uso parenteral.
- Manter fora do alcance das crianças.